



Comenzar el tratamiento con XTANDI



Las cápsulas no se muestran en su tamaño real

¿Qué es XTANDI?

XTANDI es un medicamento prescrito utilizado para tratar a los hombres con cáncer de próstata que ya no responde al tratamiento médico o quirúrgico, el cual disminuye las cantidades de testosterona y se ha propagado a otras partes del cuerpo.

La lucha contra el cáncer de próstata avanzado comienza con usted

Al comenzar el tratamiento con XTANDI, es importante entender de qué manera se debe tomar el medicamento. Esto incluye seguir las instrucciones exactas de su médico, lo que puede ayudarle a seguir el tratamiento con XTANDI.

Cómo tomar XTANDI

- ✓ Tome XTANDI una vez al día, a la misma hora, según las instrucciones de su médico
- ✓ Trague las cápsulas enteras con algún líquido, como jugo o agua. No las mastique, disuelva ni abra
- ✓ Puede tomar XTANDI con o sin alimentos
- ✓ Si se olvida de tomar una dosis de XTANDI, tómela tan pronto como lo recuerde ese día. Si se olvida de tomar su dosis normal por un día entero, tome su dosis normal de XTANDI al día siguiente a la misma hora
- ✓ No cambie su dosis ni deje de tomar XTANDI sin consultar a su médico

Información Importante sobre Seguridad

Si toma demasiada cantidad de XTANDI, llame a su médico o diríjase inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Si toma demasiada cantidad de XTANDI, puede tener un riesgo mayor de sufrir una convulsión.

▶ CONSEJOS PARA SEGUIR EL TRATAMIENTO



Tome XTANDI al momento de realizar una actividad cotidiana, como lavarse los dientes.



Utilice un calendario para seguir el tratamiento. Visite XTANDI.com/resources y descargue uno hoy mismo.



XTANDI puede causar efectos secundarios. Vea la siguiente página para obtener más información. Consulte a su médico o profesional de la salud sobre cualquier efecto secundario que le resulte molesto.



Consulte a su médico sobre los exámenes que le realizarán para evaluar su cáncer durante el tratamiento.

Un solo número de teléfono para obtener muchas respuestas. 1-855-8XTANDI



Al llamar al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634), usted podrá obtener recursos que lo ayudarán a controlar su tratamiento.

- Nuestros enfermeros están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder las preguntas que tenga sobre XTANDI*
- Nuestros especialistas de acceso dedicado están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, y podrán ayudarle a obtener y pagar por XTANDI†

Vea la Información importante sobre seguridad de XTANDI que aparece en la página siguiente junto con la Información de prescripción completa. XTANDI.com/PI.

*La consulta con nuestros enfermeros no debe reemplazar las recomendaciones de su equipo de atención de la salud.

†Sujeto a elegibilidad. Puede haber restricciones.

Información Importante de Seguridad

¿A quiénes no se debe administrar XTANDI?

XTANDI no se debe usar en mujeres. No tome XTANDI si está o tiene posibilidades de quedar embarazada. XTANDI puede provocarle daños al bebé nonato. No se sabe si XTANDI es seguro y eficaz en niños.

Antes de comenzar a tomar XTANDI, infórmele a su profesional de la salud si:

- Tiene antecedentes de convulsiones, daños cerebrales, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales.
- Sufre cualquier otra afección médica.
- Su pareja está embarazada o tiene posibilidades de quedar embarazada. Los hombres que mantienen relaciones sexuales con una mujer embarazada deben utilizar preservativo durante el tratamiento con XTANDI y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento. Si su pareja sexual tiene posibilidades de quedar embarazada, se debe utilizar un preservativo y algún otro método anticonceptivo durante el tratamiento y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento. Consulte a su profesional de la salud si tiene preguntas sobre métodos anticonceptivos. Vea “¿A quiénes no se debe administrar XTANDI?”
- Toma otros medicamentos, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. XTANDI puede alterar los efectos de otros medicamentos, y viceversa. No comience ni deje de tomar ningún medicamento antes de consultar al profesional de la salud que le recetó XTANDI.

Cómo tomar XTANDI

- Tome XTANDI según las instrucciones exactas de su profesional de la salud.
- Tome la dosis recetada de XTANDI una vez al día, a la misma hora.
- Si es necesario, su profesional de la salud puede cambiar su dosis.
- No cambie su dosis ni deje de tomar XTANDI sin antes consultar a su profesional de la salud.
- XTANDI puede tomarse con o sin alimentos.
- Trague las cápsulas de XTANDI enteras. No las mastique, disuelva ni abra.
- Si se olvida de tomar una dosis de XTANDI, tómla tan pronto como lo recuerde ese día. Si se olvida de tomar su dosis normal por un día entero, tome su dosis normal de XTANDI al día siguiente a la misma hora. No tome una dosis de XTANDI mayor a la dosis recetada en un día.
- Si toma demasiada cantidad de XTANDI, llame a su profesional de la salud o diríjase inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Si toma demasiada cantidad de XTANDI, puede tener un riesgo mayor de sufrir una convulsión.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XTANDI?

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Convulsión.** Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Debe evitar actividades en las que una pérdida repentina del conocimiento pueda causarle un daño grave a usted o a otros. Informe a su profesional de la salud inmediatamente si ha perdido el conocimiento o ha sufrido una convulsión. Su profesional de la salud terminará su tratamiento con XTANDI si usted tiene una convulsión mientras toma XTANDI.
- **Síndrome de encefalopatía posterior reversible (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES).** Si está tomando XTANDI es posible que corra el riesgo de desarrollar una afección del cerebro denominada PRES. Informe a su profesional de la salud de inmediato si tiene convulsiones o síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza, disminución de la lucidez, confusión, vista reducida, visión borrosa u otro problema de la visión. Su profesional de la salud le realizará una prueba para detectar PRES. En caso de tener PRES, su profesional de la salud detendrá el uso de XTANDI.

Los efectos secundarios más comunes del tratamiento con XTANDI son debilidad o sensación de cansancio más de lo habitual, dolor de espalda, disminución del apetito, estreñimiento, dolor en las articulaciones, diarrea, sensación de calor, infección en las vías respiratorias superiores, hinchazón de manos, brazos, piernas o pies, falta de aire, dolores de músculos y huesos, pérdida de peso, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, mareos y sensación de que usted o las cosas a su alrededor se mueven o giran (vértigo).

XTANDI puede provocar infecciones, caídas y lesiones provocadas por caídas. Informe a su profesional de la salud si nota signos o síntomas de alguna infección o si sufre una caída.

Informe a su profesional de la salud si nota algún efecto secundario persistente o que le moleste. Los efectos secundarios mencionados aquí no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI. Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o farmacéutico.

Llame a su médico para consultarle sobre los efectos secundarios. Puede comunicar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa sobre XTANDI.com/PI.



XTANDI, Astellas, and the flying star logo are trademarks of Astellas Pharma Inc.

XTANDI Support SolutionsSM is a component of Astellas Access ServicesSM.

© 2015 Astellas Pharma US, Inc. 076-1052-PM 9/15

